

Link do produktu: <https://www.twoja-apteczka.pl/pierwsza-pomoc-w-odmrozeniach-instrukcja-pdf-p-1541.html>

Pierwsza pomoc w odmrożeniach - instrukcja PDF

Producent

Ratownictwo

Opis produktu

Produkt niedostępny w dłuższym okresie czasowym.

Pierwsza pomoc w odmrożeniach - instrukcja PDF

Przechłódzenia i odmrożenia zdarzają się również w temperaturze powyżej 0°C

Przechłódzenie to wyziębienie całego ciała i może nastąpić zawsze, gdy zbyt lekko ubrany człowiek przebywa przez dłuższy czas w niskiej temperaturze.

Przechłódzeniu sprzyja działanie wilgoci i wiatru oraz ogólne wyczerpanie, zły stan ogólny lub schorzenia towarzyszące, np. wstrząs

Rozróżnia się trzy stadia wychłodzenia:

okres obronny, gdy temperatura centrum ciała wynosi 36 - 34 oC, pojawiają się silne dreszcze, skóra jest biała i zimna, występuje "gęsia skórka", wargi są sine, tętno i oddech przyśpieszone, stadium wyczerpania, gdy temperatura centrum ciała wynosi 34 - 27 oC, ustaje drżenie z zimna, pojawia się kurczowe drętwienie mięśni oddech staje się wolniejszy i bardziej powierzchowny, występują przerwy w oddychaniu, zwalnia się również tętno i pojawiają się zaburzenia rytmu, zanika odczuwanie bólu, następuje apatia, wreszcie człowiek zapada w sen, poniżej temperatury 30oC następuje utrata przytomności i całe ciało staje się zimne, letarg - śmierć mózgowa, przy niższej temperaturze ciała ustają czynności życiowe, kurczowe zdrętwienie mięśni ustępuje wiotkiemu porażeniu, brak przytomności, sztywne źrenice, brak ruchów oddechowych, tętno niewyczuwalne, jeżeli najpóźniej w tym okresie nie przystąpi się do reanimacji, następuje zgon. Badanie tętna osoby będącej w hipotermii (znaczne oziębienie ciała) powinno trwać przez 1 minutę. W przypadku stwierdzenia braku tętna powinno się przez pierwsze 3 minuty prowadzić tylko wentylację (w celu ogrzania ciała od wewnątrz), a następnie powtórzyć badanie tętna, również przez 1 minutę. I w przypadku potwierdzenia braku tętna rozpocząć reanimację.

Odmrożenia

Na odmrożenia narażone są wystające części ciała, a sprzyja temu niska temperatura, lekkie i obcisłe ubranie oraz wilgoć.

Odmrożenia dzielimy na 4 stopnie:

skóra jest przejściowo zaczerwieniona i obrzęknięta, występuje silna bolesność, prócz znacznego obrzęku tworzą się pęcherze na sino przekrwionej skórze, występuje silny ból, skóra przyjmuje barwę niebieskoczarną, tkanki na różnej przestrzeni ulegają obumarciu, następuje całkowite zamarznięcie tkanek. Odmrożona skóra stwarza zagrożenie zakażeniem.

Zamawiając ten plik proszę wybrać opcję odbiór osobisty.

Po złożeniu zamówienia można samodzielnie pobrać plik w formacie pdf.

W przypadku zainteresowania wszystkimi artykułami można zamówić publikację, która zawiera wszystkie pliki w cenie 15,90zł

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja pliku: Plik w formacie PDF